MÉMOIRES

DE LA SOCIÉTÉ

d'Agriculture, Sciences et Arts

D'ANGERS.

3.e Volume. 32 4.e et 5.e Livraisons.

ANGERS,

DE L'IMPRIMERIE DE VICTOR PAVIE.

1837.

Nous voici arrivé à la troisième année de nos observations sur les Fleurs et les Fruits qui ont pris naissance dans le département de Maine et Loire.

Si l'énumération que nous allons en faire ne présente pas un nombre de variétés aussi grand que celui de l'année précédente, cela tient à une cause qu'il est bon de faire connaître. Ainsi nous dirons d'abord que les variations atmosphériques trop répétées qui se sont succédées pendant le cours de l'hiver et du printemps dernier ont fait périr un grand nombre d'individus tant des semis de l'année que de l'année précédente ; en second lieu, que les plantes qui ont résisté à cette épreuve de température, n'ayant donné, pour la plupart, que des fleurs imparfaites, nous avons dû nécessairement en ajourner la description. Ainsi ce retard, en quelque sorte commandé, ne peut qu'être favorable à ces nouvelles variétés ; car quelques précautions que nous ayons prises pour ne décrire, par exemple, les Roses qu'à leur seconde année de floraison, il n'en n'est pas moins vrai que quelques-unes ne se montrent telles qu'elles doivent être qu'après

une époque plus reculée. C'est ainsi que la *Rose Maréchal*, que tout le monde connaît, bien qu'on ait pu juger sa fleur dès la seconde année de floraison, n'a pu néanmoins être connue sous ses autres rapports que quelques années après. Il était impossible en effet de prévoir plutôt que cette variété deviendrait sarmenteuse, et au point de couvrir un espalier de 12 à 15 pieds carrés.

C'est par un motif semblable que nous nous sommes abstenu de comprendre au nombre de nos descriptions de cette année plusieurs variétés de Roses obtenues de graines par différens jardiniers, mais que nous décrirons lorsqu'elles auront acquis toutes leurs perfections.

Ces observations nous portent naturellemeut à reconnaître l'utilité qu'il y aurait de présenter au bout de quelques années une revue horticole de notre pays, dans laquelle il ne serait parlé que des fleurs vraiment belles, comme des fruits de bonne qualité: en tenant compte des modifications apportées par le temps ou bien par la culture, qui ne doit pas être la même pour toutes les variétés indistinctement.

Sans nous appésantir longuement sur cette dernière assertion, nous allons donner cependant quelques exemples pris encore parmi les

Roses. Nous citerons donc à ce sujet cette belle Rose du nom de *Maréchale de Villars*, qui, au nord de la France ne fleurit pas toujours bien, tandis qu'à une latitude plus élevée, cette variété ne cesse de se couvrir de fleurs pendant la belle saison : avantage dont on peut encore prolonger la durée en tenant cette plante, à l'époque des froids, soit en serre chaude, soit en serre tempérée; car dans l'une comme dans l'autre de ces deux serres, cette belle Rose, d'un parfum particulier, se montre encore dans toute sa beauté. C'est donc de la chaleur qu'il lui faut, comme l'ombre est nécessaire à cette autre Rose, l'*Ermite de Granval*, très grosse fleur qui ne peut s'épanouir, lorsque le soleil, en dardant ses rayons brûlans sur ses boutons trop pleins, la durcit encore au lieu d'en favoriser le développement; tandis que cultivée à l'ombre, même sous un arbre, cette fleur s'ouvre parfaitement bien.

Cette observation pouvant s'appliquer à toutes les Roses que trop de plénitude empêche de bien ouvrir, on peut en faire une règle générale qui donnera l'indication d'une culture appropriée.

DESCRIPTION

DES FLEURS ET DES FRUITS

NÉS

Dans le Département de Maine et Loire ;

PAR M. MILLET,

Membre de plusieurs Sociétés savantes.

SUITE (1836.)

CULTURE DE M. BIZARD, CONSEILLER A LA COUR ROYALE D'ANGERS.

Danaé (*Eglantier de Bourbon*). Buisson vigoureux ; folioles petites, fortement dentées. Pédoncule hispidule. Ovaire lisse, obconique. Fleur de 2 po. 6 à 8 lig. de diam., d'un *rose tendre* uniforme, odorante. Première floraison 1834.

Jolie variété.

Le Solitaire (*Eglantier de Bourbon*). Buisson vigoureux. Feuillage petit. Pédoncule long, hispide,

ainsi que l'ovaire qui est ovoïde. Fleur tombante, de 26 lign. de diam., bien pleine, d'un beau rouge légèrement teint de lilas : cette couleur moins foncée en dedans des pétales. Première floraison 1835.

Jolie variété, qu'on distinguera facilement des autres roses de cette division, à son feuillage petit.

Sophie Marais (*Thé*). Buisson vigoureux, à rameaux verts. Aiguillons violacés. 3 à 7 folioles moyennes, d'un vert sombre. Pédoncule *long*, droit, fort. Fleur assez pleine, épaisse, de 4 po. de diam. Pétales larges, d'un rose tendre et du tissu le plus fin. Première floraison 1835.

Fleur très remarquable par sa dimension ainsi que par sa fraîcheur.

Le Nid d'Amour (*Thé*). Buisson vigoureux, à rameaux droits, violacés. Aiguillons rares, presque droits. Ovaire hémisphérique. Pédoncule *très long*, hispidule. Fleur de 3 po. de diam., épaisse, assez droite, très pleine, concave, épanouissant bien, sans néanmoins s'ouvrir beaucoup, d'un beau rose, qui pâlit sur les pétales extérieurs. Première floraison 1835.

Fleur des plus jolies.

CULTURE DE M. GUÉRIN, JARDINIER-FLEURISTE.

(Route de Paris.)

Paris (*Thé*). Buisson vigoureux. Feuilles ovales, petites. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire court, obconique. Fleur de 3 po. de diam., très pleine, mais s'ouvrant bien, droite, d'un beau rose vif, plus foncé au centre, rarement solitaire. Première floraison 1835.

Jolie fleur.

Pindare (*Bengale*). Buisson arrondi. Feuillage moyen. Ovaire hémisphérique. Pédoncule *droit*, rougeâtre, hispidule. Fleur de 28 à 30 lig. de diam., bien pleine, droite, bien faite; à pétales bien placés, d'un beau *rose vif*, légèrement bordés de blanc en vieillissant. Première floraison 1835.

Fleur bien remarquable, dont la facture rappelle la forme de certains Camélias.

Pauline de Montdeville (*Damas*). Buisson bien fait. Aiguillons petits, rapprochés. 3 à 5 folioles ovales-oblongues. Ovaire en massue, hispidule. Fleur

bien pleine, d'un beau rose tendre, couronnée au centre. Première floraison 1835.

Très jolie fleur.

CULTURE DE M. FLON, JARDINIER.

(Au bout du Mail, à Angers.)

Agénor (*Thé*). Buisson assez vigoureux. Aiguillons presque droits, violacés. Pédoncule fort, hispidule. Fleur droite, assez pleine, de 3 po. de diam., d'un beau rose vif au centre, d'un rose pâle au pourtour. Odeur légère de thé. Première floraison 1835.

Jolie variété.

Thé rubescent. Buisson peu vigoureux, feuillage petit. Fleur semi-pleine, rougeâtre.

Hermione (*Hybride d'Eglantier de Bourbon*). Buisson vigoureux. Folioles fortement dentées et bordées de pourpre. Fleur pleine, bien faite, d'un *beau rouge vif*. Première floraison 1835.

Très belle fleur non remontante.

CULTURE DE M. MANSAIS, JARDINIER.

(Paroisse de S.t-Joseph, à Angers.)

Thé Mansais. Buisson vigoureux, à rameaux d'un vert plus ou moins violacés. Aiguillons forts, droits. 3 à 7 folioles ovales-lancéolées, d'un beau vert luisant. Pédoncule long de 3 po. à 3 po. 6 lig., *hispidule*. Fleur très grande (4 po. de diam.), tombante, très pleine, mais s'ouvrant bien; à pétales un peu allongés, d'un *rouge tendre lavé d'aurore*, roulés en couronne au centre de la fleur. Odeur de thé très prononcée. Première floraison 1835.

Superbe fleur, qui prend quelquefois, par un soleil ardent, une teinte rouge vif, comme le fait le *Thé-Hamon*.

CULTURE DE M. LEROY, DU GRAND-JARDIN, PÉPINIÉRISTE.

(Route de Paris, à Angers.)

Le Thé du grand-jardin. Buisson vigoureux, à rameaux verts, maculés de brun. Aiguillons droits,

rouges. Folioles ovales acuminées. Pédoncule droit, hispidule. Fleur grande (3 po. à 3 po. 6 lig. de diam.), pleine, bien faite, d'un *rose auroré*. Première floraison 1835.

Très belle variété.

CULTURE DE M. GOUBAULT, JARDINIER.

(Faubourg S.t-Michel.)

Belphégor (*Thé*). Buisson arrondi, à feuillage petit. Pédoncule *droit*, hispidule. Fleur droite, de 3 po. 6 lig. de diam., assez pleine, bien ouverte, d'un beau rose lavé de rouge. Odeur de *Mélisse* très prononcée. Première floraison 1835.

Cette Rose, dont l'odeur s'éloigne complètement de celle des autres roses, présente un fait assez remarquable pour attirer l'attention de l'amateur.

Thé Cruor. Buisson vigoureux, à rameaux violacés. Feuillage petit, vert foncé. Pédoncule droit, fort, *lisse*. Fleur de 3 po. à 3 po. 6 lig. de diam., droite, assez pleine, d'un *rouge très foncé :* cette couleur d'un rouge plus intense au dehors des pétales, dont les extérieurs sont larges et *mucronnés*. Première floraison 1834.

Cette variété est des plus remarquables par sa couleur.

Thé Caméléon. Buisson bien fourni, arrondi, à rameaux d'un vert violacé. Pédoncule court (1 po.), hispidule à la base seulement. Ovaire gros, ovoïde ou sphérique. Fleur de 24 à 30 lig. de diam., droite, bien pleine, un peu en coupe, d'un rouge pâle en naissant, qui se fonce bientôt et devient ensuite d'un pourpre noir. Pétales extérieurs assez larges, ordinairement *acuminés ;* les intérieurs étroits, pliés en gouttière. Odeur particulière. Première floraison 1835.

Par ses couleurs successives de diverses nuances, cette rose rappelle le Bengale du même nom.

CULTURE DE M. BOUGÈRE, JARDINIER-FLEURISTE.

(Faubourg Gauvin.)

Thé Bougère. Buisson arrondi, très vigoureux. Aiguillons forts. 3 à 7 folioles, ovales-acuminées, ondulées sur les bords, d'un vert foncé. Pédoncule fort, hispide. Ovaire très gros, hémisphérique. Fleur droite, grande (3 po. 6 lig. à 4 po. de diam.), épaisse, très pleine, mais s'ouvrant bien quoique lentement, d'un *beau rose* : cette couleur plus pâle, sur les pétales extérieurs, qui sont grands, retournés sur les bords. Les pétales intermédiaires sont

concaves et enveloppent ceux du centre qui sont pliés et chiffonnés. Première floraison 1836.

Très belle fleur et d'un effet remarquable.

Niphetos (*Thé*). Buisson assez vigoureux. 3 à 5 folioles ovales, petites. Pédoncule quadrangulaire, hispidule. Fleur de 3 po. de diam., pleine bien faite, d'un *blanc pur*. Pétales extérieurs larges, ceux du centre étroits et comme chiffonnés. Première floraison 1835.

Très belle fleur, remarquable par sa blancheur éclatante.

Séraphine (*Noisette*). Buisson non sarmenteux, arrondi, bien fait. 3 à 7 folioles ovales, petites, d'un vert foncé. Pédoncule, sépales et ovaire hispidules; ce dernier comme globuleux. Fleurs en panicule, de 20 à 24 lig. de diam., pleines, bien faites, d'un beau rose. Première floraison 1835.

Jolie variété, qui, pendant toute la belle saison, se couvre de fleurs.

CULTURE DE M. VAU, JARDINIER-FLEURISTE.

(Rue S.t-Samson.)

Démophile (*Thé*). Buisson assez vigoureux. Aiguillons forts, violacés. Pédoncule droit, hispidule.

Fleur droite, assez pleine, de 3 po. de diam., d'un beau *rose vif*. Odeur de thé bien prononcée. Première floraison 1835.

Jolie variété.

CULTURE DE M. BURET, JARDINIER FLEURISTE.

(Route de Paris.)

Thé Igné. Buisson arrondi, bien fait. Feuillage moyen. 3 à 7 folioles ovales, ondulées. Aiguillons forts. Pédoncule hispidule. Fleur de 3 po. 5 à 6 lig. de diam., tombante, très pleine, mais s'ouvrant bien, d'un *rouge vif uniforme*. Première floraison 1835.

Fleur des plus jolies.

CULTURE DE M. ROUSSEAU, JARDINIER-FLEURISTE.

(A Angers.)

Procris (*Eglantier de Bourbon*). Buisson vigoureux. 3 à 5 folioles cordiformes, grandes. Pédoncules hispidules à la base seulement. Ovaire lisse.

Fleur pleine, de 2 po. 6 lig. de diam. Pétales larges, un peu mucronnés, ceux du centre comme chiffonnés, tous d'un *beau rose pur*. Première floraison 1835.

Jolie rose, remarquable par sa fraîcheur.

Pelargonium Memorabile. Buisson petit, bien fait. Feuilles lisses, pliées et comme trilobées. Ombelle droite de 5 à 6 fl. de 18 à 20 lig. de diam., d'un *rose hortensia;* avec les macules d'un *noir velouté très foncé*, bordées et striées de *carmin* sur les pétales supérieurs; et d'un rouge plus ou moins foncé sur les pétales inférieurs. Première floraison 1836.

Fleur des plus jolies, venue de *l'olympicum*.

P. Fuliginosum. Buisson de moyenne taille. Feuilles pas très grandes, plissées et ondulées, sans lobes bien prononcés. Ombelle de 4 à 5 fleurs droites de 18 lig. de diam.; à pétales supérieurs couverts presque totalement par la macule, qui est d'un *pourpre noirâtre*, variée à la base par des *lignes pourprées*. Les pétales inférieurs, sur un fond *blanchâtre* sont marqués chacuns d'une large *macule pourprée*, variée de lignes plus foncées. Première floraison 1836.

Très jolie variété.

P. Lucrosum. Buisson petit, bien fait. Feuilles moyennes, comme cordiformes, lisses. Ombelle droite de 4 à 5 fleurs de 15 à 16 lig. de diam.; à pétales larges et arrondis : les supérieurs presque entièrement couverts par la macule qui est d'un *pourpre noir velouté*, qui se fond en un *beau pourpre* vers le bord des pétales, lesquels sont terminés par un *liseré blanc*. Les pétales inférieurs sont d'un *blanc pur* et

marqués chacuns d'une *macule pourprée*. Première floraison 1836.

Très jolie fleur.

P. Limbatum. Buisson petit, bien fait. Feuilles moyennes, comme cordiformes, plissées, un peu velues. 4 à 5 fleurs droites de 15 à 18 lig. de diam.; à pétales supérieurs larges et arrondis, couverts en partie d'une macule d'un *pourpre noir velouté*, nuancée et reticulée de *pourpre*. Pétales inférieurs *blancs*, variés d'une macule formée en partie par des lignes *pourprées*. Première floraison 1836.

Très jolie variété.

P. Illustre. Buisson fourni, bien fait. Feuilles épaisses comme reniformes et un peu velues. Sépales allongées, roussâtres. Ombelles de 5 à 6 fleurs droites, de 18 à 20 lig. de diam. Pétales supérieurs larges et arrondis, couverts en partie par la macule qui est d'un *pourpre noirâtre* au centre qui se fond, sur les bords, en pourpre traversé de lignes plus foncées : ces pétales sont en outre bordés de blanc-rosé. Pétales inférieurs ovales, *blancs*, marqués chacuns d'une macule d'un *pourpre violacé* et de lignes de même couleur. Cette macule est en outre marquée d'une *languette blanche* qui la divise en deux parties. Première floraison 1836.

Superbe fleur.

P. Reticulatum. Buisson moyen, bien arrondi. Feuilles lisses, plissées et comme cordiformes. Ombelle droite de 4 à 5 fleurs de 15 à 16 lig. de diam., dont tous les pétales d'un blanc-rosé, sont couverts d'une espèce de *réseau pourpré* qui traverse la *large*

macule des pétales supérieurs et la petite macule des pétales inférieurs. Première floraison 1836.

Très jolie variété.

P. Plurifarium. Buisson arrondi, bien fait; à feuilles moyennes, lisses, comme lobées. Ombelle droite de 5 à 6 fleurs à calice *roux*. Fleurs de 15 à 18 lig. de diam. Pétales supérieurs larges et arrondis, d'un *rouge pourpré velouté* et marqués de lignes *noires veloutées*, rapprochées vers le centre : ces pétales sont en outre bordés d'un liseré rose. Pétales inférieurs oblongs, violacés, souvent échancrés et marqués de quelques veines plus foncées. Première floraison 1836.

Jolie variété qui se couvre de fleurs.

P. Necessarium. Buisson moyen, bien fait. Ombelle droite, de 5 à 6 fleurs dont les pétales supérieurs sont d'un beau rose, avec la macule d'un *violet pourpré*, passant au blanc vers la base. Pétales inférieurs d'un *blanc-rosé* maculé de rouge. Première floraison 1836.

Très belle variété.

P. Lucubratum. Buisson bien fait. Ombelle droite, de 5 à 6 fleurs de 16 à 18 lig. de diam, dont les pétales supérieurs d'un *violet clair*; sont bordés d'un liseré *violet-bleuâtre*, avec la macule d'un *noir velouté*, est traversée par un réseau ainsi que toute la largeur des pétales. Pétales inférieurs *blanc-carné, réticulés de violet* et marqués d'une macule *pourprée*, Première floraison 1836.

Très jolie variété toujours fleurie pendant la belle saison.

P. Inscriptum perfectum. Buisson moyen, bien fait. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 2 po. de diam., à pétales supérieurs d'un *blanc lilacé*, marqués d'un faible liseré blanc, avec la macule d'un *noir pourpre-violacé*. Pétales inférieurs *blancs*, marqués de nervures violacées. Première floraison 1836.

Très jolie variété, provenue du *P. Inscriptum maximum*; mais plus belle.

Toutes les variétés de *Pelargonium* que nous venons de décrire doivent être rangées parmi les *Vétulinum*.

P. Ignitum. Buisson bien fait. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 2 po. de diam.; à pétales supérieurs *rouge ponceau*, avec la macule *pourprée veloutée*. Pétales inférieurs d'un *rose-violacé*. Première floraison 1836.

Jolie variété.

P. Luminosum. Buisson bien fait. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 2 po. de diam. Pétales supérieurs *rouge-feu*, avec a macule d'un *pourpre brun velouté*. Pétales inférieurs moins foncés en couleurs que les supérieurs.

CULTURE DE M. CACHET, JARDINIER-FLEURISTE.

(A Angers.)

Pelargonium Tœnarium. Buisson arrondi, bien fait. Ombelle droite, composée de 5 à 6 fleurs de 18 à

20 lig. de diam. Pétales presque entièrement couverts par les macules qui sont d'un *noir sombre velouté*. Première floraison 1836.

Cette nouvelle variété, qui a quelques rapports avec une très belle fleur, *Anna Bolena*, doit être regardée comme une plante remarquable parmi ses congénères.

P. Luculentum. Buisson bien fait, petit. Feuilles un peu crépues, velues. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 24 à 27 lig. de diam., à pétales supérieurs, larges et arrondis, d'un beau *rose auroré*, marqués d'une macule d'un brun velouté, variée de feu et accompagnée de nervures échelonnées, disposées au côté de la macule. Pétales inférieurs *roses*, avec 3 nervures peu prononcées d'un rose plus foncé. Première floraison 1836.

Très jolie variété provenue du *P. Devonia*.

CULTURE DE M. BESNIER, JARDINIER-FLEURISTE.

(A Angers.)

Dahlia Lilacina. Buisson de 5 pieds de hauteur. Fleur très pleine, de 4 po. de diam. Parfaitement bien faite, d'un *beau lilas pur*. Première floraison 1835.

Très belle fleur.

Dahlia Celina. Buisson de 3 pieds de hauteur. Fleur tombante, de 4 po. de diam., à pétales de couleur *lie-de-vin pâle*, terminés de *jaune pur*. Première floraison 1835.

Très jolie fleur.

Dahlia Almanzor. Buisson de 3 pi. 6 po. de haut., couvert de fleurs de 4 po. de diam., pleines, d'un *rouge-violacé*. Pétales bi ou tricuspidés. Première floraison 1835.

Jolie fleur.

Dahlia Caracalla. Buisson de 4 pi. de haut. Fleur très pleine, bombée en dessus, d'un *cramoisi velouté éblouissant*. Première floraison 1835.

Superbe fleur.

CULTURE DE M. LETEMPLIER, JARDINIER-FLEURISTE.

(Au Mail.)

Pelargonium Gaudiale. Buisson arrondi. Feuilles cordiformes, à 5 lobes plissés, légèrement velues. Ombelle droite, de 4 à 5 fleurs de 20 à 22 lig. de diam.; à pétales supérieurs de couleur *amaranthe*, avec une large macule d'un *pourpre noir velouté*, variée de petites tâches *amaranthes*, et marquée à

la base d'un réseau mélangé de blanc et de pourpre. Pétales inférieurs d'un *rose lilacé*, marqués chacuns d'une macule et de nervures *pourprées*. Première floraison 1836.

Très jolie fleur, provenue du *P. Olympicum*.

CULTURE DE M. DEROUINEAU, JARDINIER.

(A Pellouailles.)

Pomme Derouineau. Fruit de 3 po. de diam., sur 2 po. 6 lig. de haut. Œil grand, ouvert, placé dans une large et profonde cavité, marquée de 8 à 10 cannelures qui alternent avec autant de côtes plus ou moins saillantes. Ces cannelures et ces côtes sont ordinairement traversées par de petites hachures brunes assez rappochées. Queue mince, longue de 8 lig. Peau lisse, d'un beau vert, qui passe au jaune pur à la maturité, mais colorée de rouge vif du côté opposé au soleil. Des points bruns épars sur toute la surface du fruit. Chair d'un blanc jaunâtre, tendre, un peu acide, bonne.

Nota. Toutes les fois que nous n'annoncerons pas qu'une rose est remontante, c'est qu'elle possède cette qualité.

CULTURES DE 1837.

Afin de ne pas mettre d'interruption et suivre un travail dont la Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers a reconnu l'utilité, nous nous sommes livré cette année, comme les années précédentes, à la recherche des nouvelles variétés de Fleurs les plus remarquables qui ont pris naissance dans notre département.

Le goût des fleurs prenant chaque jour plus d'extension, nous aurons à citer cette année plusieurs cultures nouvelles, tant parmi les amateurs que parmi les jardiniers.

C'est un progrès qu'il est bon de constater afin de bien préciser l'extension que prend l'horticulture dans le département de Maine et Loire.

Néanmoins les gains de cette année, quoique en plus grand nombre que ceux de l'année précédente, ne sont pas aussi considérables qu'ils auraient dû l'être, si l'hiver dernier n'avait occasionné des pertes immenses aux horticulteurs.

En second lieu, la réserve que nous avons apportée dans le choix des variétés nouvelles, afin de ne faire figurer dans ce recueil que les Fleurs vraiment belles et dignes d'occuper une place dans la collection du véritable amateur, a dû nécessairement encore en restreindre le nombre.

NOTA. Toutes les fois qu'il ne sera pas indiqué qu'une Rose est remontante, c'est qu'elle possède cette qualité.

DESCRIPTION

DES FLEURS ET DES FRUITS

NÉS

Dans le Département de Maine et Loire ;

PAR M. MILLET,

Membre de plusieurs Sociétés savantes.

SUITE (1837).

CULTURE DE M. BIZARD, CONSEILLER A LA COUR ROYALE D'ANGERS.

Clara Wandel (*Noisette*). Buisson vigoureux, non sarmenteux, bien fait, à rameaux d'un vert plus ou moins pourpré. Aiguillons forts, rougeâtres. 5 à 7 folioles ovales-acuminées. Pédoncule lisse. Bouton ovoïde-pointu, rouge entre les sépales. Fleurs légèrement penchées, de 3 po. 6 lig. de diam., très pleines, mais s'ouvrant bien, un peu en coupe : les cinq pétales extérieurs grands, concaves, d'un

blanc teinté de rouge par plaques. Pétales intermédiaires en forme de nacelle, de couleur *blanc-jaunâtre*, qui se fond progressivement en un beau *jaune de chrôme;* et ensuite en *teinte jaune aurore* en arrivant aux pétales du centre, qui sont disposés en couronne et d'un beau *rose-auroré*.

Telles sont les premières fleurs; tandis que celles qui suivront auront quelquefois plus ou moins de jaune, ou plus ou moins de rose.

Cette superbe rose, qui a fleuri en 1836 pour la première fois, est du petit nombre de celles qui ne paraissent que de loin en loin et comme une conquête propre à dédommager l'horticulteur des soins qu'il se donne pour obtenir des variétés nouvelles, en lui faisant éprouver ces douces jouissances qui ne sont bien senties que par le véritable amateur.

Ile-Bourbon Bizard. Buisson vigoureux. 3 à 5 folioles larges, cordiformes. Aiguillons rougeâtres. Pédoncule fort, hispidule, ainsi que les sépales. Ovaire obconique, gros, lisse. Fleur de 3 po. de diam., d'un *rouge vif*, épaisse, très pleine, mais s'ouvrant bien et comme une rose Agathe. Odeur de Capucine.

En imposant son nom à cette belle fleur, c'est dire assez que M. Bizard la regarde comme une de ses roses les plus marquantes. Le goût bien connu de cet amateur distingué nous dispense de tout autre éloge à l'égard de cette nouvelle variété, qui a fleuri en 1836 pour la première fois.

CULTURE DE M. GUÉRIN, JARDINIER-FLEURISTE.

(Route de Paris.)

Thé Romain. Buisson vigoureux. Feuillage moyen, ondulé sur les bords. Pédoncule court, hispidule. Fleur de 3 po. à 3 po. 6 lig. de diam., très pleine, mais s'ouvrant bien. Pétales extérieurs *larges*, blancs, lavés de rose dans quelques-unes de leurs parties; les intermédiaires blancs, à onglets *jaunes*; ceux du centre teintés d'aurore. Odeur particulière. Première floraison 1835.

Très jolie variété qui, par un soleil ardent, prend du rose plus ou moins vif dans la moitié de sa fleur (les pétales extérieurs).

Miranda (*Bengale*). Buisson vigoureux, à rameaux verts. Aiguillons droits, rougeâtres. 3 à 5 folioles ovales-acuminées, dentées, pourprées en naissant. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire petit, oblong, lisse. Bouton ovoïde, rouge entre les sépales. Fleur droite, de 3 po. de diam., faite en coupe. Pétales non pressés et comme flottants, bien placés; les cinq extérieurs sont grands, d'un *blanc*

teinté de rose ; les pétales intermédiaires sont concaves, cordiformes, légèrement retournés sur les bords et d'un *blanc pur*, ils enveloppent les intérieurs qui sont oblongs, concaves, comme chiffonnés, d'un *rose vif,* dans leur moitié supérieure et *blancs* dans l'autre moitié. Quelques étamines au centre de la fleur. Première floraison 1836.

Cette superbe Rose, du tissu le plus fin et comme de *gaze,* doit être mise au nombre de celles qui se font remarquer par quelque singularité. Celle-ci, indépendamment de sa jolie forme, donnant assez l'idée de deux roses l'une dans l'autre, ne peut manquer de fixer l'attention générale.

Astrée (*Damas*). Buisson vigoureux, à rameaux d'un vert pâle. Aiguillons fins, arqués. 3 à 5 folioles grandes, ovales-lancéolées. Pédoncule et ovaire glanduleux. Sépales un peu allongés, terminés en lance. Fleur droite, de 4 po. 6 lig. de diam., bien pleine, mais s'ouvrant bien ; à pétales d'un beau rose, placés comme ceux du *Rosa centifolia ;* d'un rose plus vif au centre de la fleur. Première floraison 1836.

Superbe fleur.

Atalante (*Hybride de....*) Buisson vigoureux. Aiguillons petits, rougeâtres. 5 folioles petites, ovales, ondulées. Pédoncule droit, hispide. Ovaire obovale, gros, lisse. Fleur droite, de 3 po. 6 lig. à 4 po. de diam., très pleine, mais s'ouvrant bien, d'un beau rouge, qui diminue d'intensité en s'éloignant du centre de la fleur. Première floraison 1836.

Superbe fleur.

CULTURE DE M. BARBOT, JARDINIER.

(Route de Paris, à Angers.)

Thé Barbot. Buisson arrondi, vigoureux, à rameaux verts. Joli feuillage. Pédoncule court, hispidule. Ovaire gros, presque sphérique. Fleur droite, bien faite, de 3 po. à 3 po. 6 lig. de diam., très pleine, mais s'ouvrant bien et sans trop s'étaler. Pétales extérieurs *roses*, ombrés de *rouge;* les intérieurs d'un beau *jaune aurore*. Première floraison 1836.

Superbe fleur.

CULTURE DE M. FLON, JARDINIER.

(Au bout du Mail, à Angers.)

L'Abricotée (*Thé*). Buisson assez vigoureux, à rameaux violacés. 3 à 5 folioles d'un vert pourpré. Pétales violets. Pédoncule droit, presque lisse. Ovaire petit, lisse, comme globuleux. Fleur droite,

de 3 po. de diam. ; à pétales d'un beau *rose auroré* intérieurement ; mais *roses* seulement à leur extérieur. Première floraison 1836.

Très jolie variété.

Fulgorie (*Hybride de Damas et d'Ile-Bourbon*). Buisson vigoureux, à rameaux verts. Aiguillons forts, rougeâtres, arqués. 5 à 7 folioles grandes, ovales-pointues, fortement dentées, bordées de pourpre. Pédoncule hispidule. Ovaire en massue, lisse. Panicule de 3 à 9 fleurs pleines, de 3 po. de diam., comme globuleuses, d'un *rose-vif, brillant*. Pétales rassemblés en boule, bien arrangés et comme flottants ; mais les extérieurs qui sont larges, légèrement retournés à leur bord supérieur, concaves, enveloppent les pétales intérieurs qui sont pliés et comme chiffonnés.

Superbe rose remontante qui a fleuri en 1834 pour la première fois.

Atalante (*Noisette*). Buisson vigoureux, sarmenteux, 5 à 7 folioles moyennes, d'un vert foncé. Pédoncule hispidule. Ovaire obconique. Fleurs en panicule, droites, de 20 à 24 lig. de diam., très pleines, mais s'ouvrant bien, d'un *violet lilacé*. Pétales imbriqués ; ceux du centre disposés en couronne. Première floraison 1835.

Jolie variété.

CULTURE DE M. GOUBAULT, JARDINIER.

(Faubourg S.t-Michel.)

Cassiope (*Thé*). Buisson vigoureux, à rameaux violacés. Pédoncule court, droit, hispidule, quadrangulaire, fort. Fleur de 3 po. 9 lig. à 4 po. de diam. bien pleine ; à pétales allongés et retournés, d'un *blanc auroré*. Première floraison 1835.

Jolie variété provenue du Thé jaune.

Pharaon. (*Thé*). Buisson vigoureux, à rameaux et aiguillons violacés. Feuillage vert foncé, grand. Pédoncule droit, hispide. Fleur de 3 po. 6 à 9 lig. de diam., bien pleine, à larges pétales non pressés et comme flottants, d'un *beau rose*, cette couleur plus foncée au centre de la fleur qui recèle quelques pétales marqués de *nervures blanches*. Première floraison 1836.

Jolie variété, dont l'aspect est un peu celui d'une pivoine herbacée.

Ariane (*Damas*). Buisson vigoureux, à rameaux verts. Aiguillons assez longs, minces, rapprochés, rougeâtres. Pédoncule glanduleux. Ovaire obconique, en *partie glanduleux* (partie supérieure lisse). Feuilles de la Rose du Roi. Fleur de 2 po. 9 à

10 lig. de diam., très pleine, bien faite, d'un *blanc carné*. Première floraison 1836.

Très jolie fleur.

Euphrosine (*Noisette*). Buisson vigoureux, à rameaux sarmenteux. 3 à 5 folioles ovales lancéolées, d'un vert-pâle. Pédoncule hispidule, droit. Ovaire allongé, en partie lisse. Panicule de 5 à 10 fleurs droites, de 2 po. 6 lig. à 3 po. de diam., bien faite, un peu en coupe, d'un *blanc carné*, *teinté d'aurore* vers le centre. Pétales *acuminés*, les extérieurs ovales, larges, ceux du centre allongés. Odeur particulière. Première floraison 1836.

Très belle fleur.

CULTURE DE M. MANSAIS, JARDINIER.

(Paroisse de S.t-Joseph, à Angers.)

Papavero (*Thé*). Buisson assez vigoureux. 3 folioles ovales, ondulées. Pédoncule hispide. Ovaire ovoïde. Fleurs de 3 po. 6 lig. de diam., assez pleine; à pétales larges et allongés, non pressés et *comme flottants*, d'un *rouge tendre*, mais l'onglet est *jaune-pâle*. Première floraison 1836.

Jolie variété.

Lactans (*Noisette*). Buisson vigoureux, fort, à ra-

meaux verdâtres, non sarmenteux. 5 à 7 folioles ovales-lancéolées, d'un beau vert (joli feuillage). Pédoncule et ovaire recouverts d'un duvet très fin, panicule de 8 à 10 fleurs de 3 po. 6 lig. de diam, assez pleines, bien faites, d'un *blanc-de-lait pur ;* quelques étamines au centre de la fleur. Première floraison 1836.

Cette jolie variété, qui a quelques rapports avec la *Rose Maréchal*, a été obtenue de graine par M. Boisdron et donnée à M. Mansais, dont elle fait partie des cultures.

CULTURE DE M. AUGEUL, JARDINIER-FLEURISTE.

(Rue Hanneloup.)

Bengale Endymion. Buisson vigoureux, à rameaux verts. 3 à 5 folioles ovales-lancéolées. Pédoncule hispide. Fleur penchée, de 3 po. 2 à 3 lig. de diam., très pleine, mais s'ouvrant bien, sans néanmoins s'étaler. Pétales d'un *tissu fin, léger*, d'un beau *rose lilacé*. Odeur particulière. Première floraison 1836.

Très belle fleur et des plus remarquables.

CULTURE DE M. BRAUX, AMATEUR.

(A Corzé.)

Pelargonium Prænubilum. Buisson bien fait. Feuilles moyennes, crépues, comme canelées, lisses. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 20 à 24 lig. de diam.; à pétales supérieurs larges et arrondis, d'un *pourpre amaranthe*, couverts en partie par une large macule d'un *pourpre brun velouté* et de nervures *pourprées*. Pétales inférieurs d'un *blanc carné*, variés par des nervures et une macule pourprée. Première floraison 1837.

Très belle fleur provenue du *P. Inscriptum maximum*.

CULTURE DE M. BELLANGER.

(Route de Paris.)

Thé Nancy. Buisson assez vigoureux, à rameaux verdâtres. Aiguillons rares. 3 à 5 folioles, assez

grandes, ovales. Pédoncule lisse. Fleur de 3 po. à 3 po. 6 lig. de diam., tombante, très pleine, à pétales comme chiffonnés d'un rouge *vif éclatant*. Première floraison 1836.

Très belle fleur.

M. Bellanger a encore obtenu de graine une très belle rose thé, qui a les plus grands rapports avec le *Thé cels*, et à laquelle il a donné le nom de *Thé Bellanger*.

CULTURE DE M. LEBRETON, JARDINIER.

(Route de Paris.)

Dédalion (*Thé*). Buisson vigoureux, à rameaux divergents. Pédoncule long, très fort, droit. Fleur de 3 po. 3 à 4 lig. de diam., très pleine, quelque. is prolifère; à pétales blancs, teintés de rose et disposés par groupes. Première floraison 1836.

Jolie variété.

CULTURE DE M. LEPAGE, JARDINIER.

(Chemin de Frémur, près Angers.)

Antéros (*Bengale*). Buisson vigoureux, à rameaux verdâtres. Aiguillons rares. Pédoncule hispidule.

Ovaire obconique, vert. Fleur grande (3 po. de diam.), bien faite, très pleine, mais s'ouvrant bien, un peu en coupe. Pétales d'un tissu *fin*, *léger et comme de gaze;* les extérieurs larges, *blancs, à onglets jaunes*, enveloppant les pétales intérieurs, qui sont plus étroits et d'un *jaune pâle teinté d'aurore.* Première floraison 1836.

Superbe fleur, qui ne peut manquer de fixer l'attention des amateurs.

CULTURE DE M. CHESNEAU, AMATEUR.

(A Angers.)

Ferdinand (*Bengale*). Buisson petit, bien fait, à petit feuillage. Fleur droite, pleine, à pétales acuminés, bien imbriqués, d'un *beau rouge carmin*, bordés d'un léger *liseré blanc.* Première floraison 1835.

Jolie variété qui prend une teinte violacée en vieillissant.

Pauline (*Noisette*). Buisson arrondi; non sarmenteux. Joli feuillage à folioles ovales. Panicule de 20 à 30 fleurs droites, de 2 po. 6 à 8 lig. de diam., bien faites; à pétales d'un beau rouge intérieurement, mais roses à l'extérieur. Première floraison 1835.

D'un joli effet et toujours fleurie.

CULTURE DE M. VAU, JARDINIER.

(Faubourg S.t-Samson.)

Bengale S.t-Samson. Buisson arrondi, bien fait, à rameaux violacés. Pédoncule droit, hispide. Fleur droite, de 2 po. 6 à 8 lig. de diam., très pleines, mais s'ouvrant bien. Pétales *rouges en dehors*, d'un *rose-hortensia en dedans*. Première floraison 1835.

Jolie variété.

CULTURE DE M. BESNIER, JARDINIER-FLEURISTE.

(Rue des Bas-Chemins.)

Morphée (*Thé*). Buisson vigoureux, à rameaux et aiguillons d'un violet foncé. Feuillage moyen, d'un vert sombre. Pédoncule hispidule. Ovaire gros, hémisphérique. Fleur de 3 po. de diam., penchée; faite en coupe, épaisse, mais s'ouvrant bien, sans

néanmoins s'étaler, d'un *beau rose*, ordinairement nuancé de *rose plus foncé*. Première floraison 1836.

Jolie variété provenue du *Thé Jaune*.

Nacor (*Thé*). Buisson vigoureux. 5 à 7 folioles. Pédoncule fort, hispidule. Fleur de 3 po. de diam., très pleine, mais s'ouvrant bien, d'un *rose vif*: cette couleur, moins vive sur les pétales extérieurs qui sont en outre repliés sur les bords. Dehors des pétales plus foncé que le dedans. Première floraison 1836. Jolie variété.

Soliman (*Thé*). Buisson vigoureux. 3 à 5 folioles, petites, ovales. Pédoncule anguleux, rude au toucher. Fleur de 3 po. de diam., bien pleine, un peu applatie en-dessus, d'un beau *rose* qui se fonce plus ou moins en vieillissant, les deux rangs de pétales extérieurs larges et arrondis, ceux du centre comme chiffonnés. Première floraison 1836.

Jolie variété.

Plutonie (*Noisette*). Buisson bien fait, non sarmenteux. 5 à 7 folioles, petites, ovales-lancéolées. Panicule de fleurs droites, de 2 po. de diam., pleines, à pétales non pressés et comme flottants, ovales cordiformes, d'un *pourpre foncé* avec l'onglet *blanc*. Première floraison 1836.

Très jolie variété, toujours fleurie et d'une couleur rare parmi les roses de cette division.

Pelargonium Nicidum. Buisson bien fait. Feuilles moyennes, velues, fortement dentées. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 18 à 20 lig. de diam.; pétales supérieurs d'un *beau rouge éclatant*, avec une large macule d'un pourpre noir velouté, variée de feu

et de raies noires. Pétales inférieurs d'un rose tendre uniforme. Première floraison 1837.

Jolie fleur.

P. Undulatum. Buisson bien fait. Feuilles moyennes, comme à 5 lobes, lisses. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 2 po. de diam. Pétales supérieurs larges et arrondis, *ondulés* à leur bord supérieur, d'un beau *rouge amaranthe;* avec une large macule d'un pourpre noir velouté, variée de petites taches blanches et de raies brunes. Pétales inférieurs *ondulés*, d'un *beau rose lilacé*. Première floraison 1837.

Jolie fleur.

P. Lepidum. Buisson fourni, bien fait. Feuilles petites. Ombelle de 4 à 5 fleurs droites de 20 à 22 lig. de diam. Pétales supérieurs couverts, pour la plus grande partie, par une macule d'un *pourpre noir*, dont la couleur s'atténue, vers les bords, en *pourpre* et *amaranthe pâle*; partie inférieure de la macule rayée de noir pourpré. Pétales inférieurs, blanc-rosé, avec une petite macule d'un pourpre amaranthe.

Dahlia floridula. Buisson haut de 4 pieds, bien fait, surmonté de fleurs larges (4 po. 6 lig. de diam.), légèrement convexes. Ligules parfaitement imbriquées, celles du centre en cornets; les suivantes jusqu'au bord extérieur sont pliées en gouttière, et marquées de 3 petits plis. Teinte d'un *rose auroré*, mais d'un beau *jaune* à la base des ligules. Cette belle fleur se colore un peu en vieillissant. Première floraison 1837.

Dahlia Nérina. Buisson de 4 pieds de hauteur, terminé par des fleurs de 4 po. 6 lig. de diam.

Ligules larges à fond *blanc* veiné de *rose*, et teinté de cette même couleur au bord des pétales. Première floraison 1837.

CULTURE DE M. AUDIO, AMATEUR.

(A Pellouailles.)

Carnéolie (*Thé*). Buisson vigoureux, à rameaux verts, un peu divergents. 5 à 7 folioles. Pédoncule long, hispidule. Fleur de 3 po. de diam. en coupe. Pétales extérieurs larges, *blanc-carnés*, enveloppant les pétales du centre qui sont pliés en gouttière et d'un *carné tendre*. Peu odorante, quelquefois prolifère. Première floraison 1836.

Jolie variété.

Dahlia Gemma. Buisson bien fait, de 4 pieds de hauteur, couronné de fleurs bien faites, comme en demi-globe, de 3 po. 6 lig. de diam. Ligules bien imbriquées, d'un *pourpre foncé brun velouté;* cette couleur diminuant d'intensité du centre à la circonférence. Quelques écailles au centre de la fleur. Première floraison 1836.

Fleur élégante et parfaitement bien faite.

Dahlia Parnassia. Buisson bien fait, couronné de fleurs en demi-globe, de 3 po. de diam.; à ligules en cornets, bien imbriquées, d'un *beau pourpre* :

cette couleur plus foncée vers le centre de la fleur. Première floraison 1836.

Jolie variété.

CULTURE DE M. LETEMPLIER, JARDINIER-FLEURISTE.

(Au Mail.)

Agérasie (*Perpétuelle*). Buisson vigoureux, bien fait, à rameaux couverts d'aiguillons droits, minces et inégaux. Feuille composée de 5 à 7 folioles ovales-oblongues, d'un beau vert, bordées de pourpre dans le jeune âge. Pédoncule court, couvert, ainsi que l'ovaire qui est obconique, de poils glanduleux. Fleur de 3 po. de diam., bien faite, très pleine, mais s'ouvrant bien. Pétales larges, cordiformes, bien imbriqués d'un beau rose tendre; ceux du centre enroulés en couronne, du milieu de laquelle sortent quelques étamines.

Joli buisson, beau feuillage, superbe fleur et bien *remontante;* gagnée par un amateur et donnée à M. Letemplier; c'est un gain précieux qui ne peut manquer d'être recherché.

Pelargonium Recordatum. Buisson arrondi, bien fait. Feuilles moyennes, à 3 lobes principaux, un peu rudes au toucher. Ombelle de 3 à 5 fleurs droites de 12 à 15 lig. de diam. Pétales arrondis; les supé-

rieurs bordés de rose et couverts presque totalement par la macule, qui est d'un *noir pourpré velouté* qui se fond en pourpre varié de lignes noires. Pétales inférieurs d'un beau rose, avec une petite macule pourprée d'où partent 3 à 4 raies longitudinales de même couleur. Première floraison 1837.

Cette jolie variété, qui se couvre de fleurs pendant toute la belle saison, a quelques rapports avec le *P. Olympicum*, dont il rappelle la beauté; mais sa fleur est moins grande.

P. Veneratum. Buisson petit, bien garni. Feuilles comme cannelées à 5 lobes, douces au toucher. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 18 à 20 lig. Pétales larges et arrondis, d'un *rose hortensia*, les supérieurs marqués d'une large macule d'un *noir pourpré velouté* qui se fond en *pourpre* près le pourtour des pétales : cette macule est traversée de lignes *brunes* et de lignes *pourprées*. Les pétales inférieurs, larges et arrondis, sont traversés par une large macule *amaranthe*, rayée *de pourpre*. Première floraison 1837.

Très belle fleur provenue du *P. Anna Bolena*.

P. Virgatum. Buisson bien fait. Feuilles moyennes, douces au toucher. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 20 à 22 lig. de diam. Pétales supérieurs d'un *rose hortensia*, presque totalement couverts par la macule, qui est d'un *violet-noir* et pourpré, et variés inférieurement ainsi que sur les parties latérales par des raies disposées en réseau. Pétales inférieurs *rose hortensia*, marqués d'une large macule *pourprée* et de 3 raies de même couleur.

Jolie variété provenue du *P. Anna Bolena*.

P. Præpositum. Buisson bien fourni. Feuilles lisses, comme à 7 lobes. Ombelles de 4 à 5 fleurs de 20 lig. de diam; à pétales larges et arrondis, les supérieurs presque totalement couverts par la macule qui est d'un *brun pourpré velouté* vers le centre; et dont la couleur en s'atténuant, passe au *pourpre* et ensuite à *l'amaranthe* vers les bords qui sont d'un beau *rose*. Pétales inférieurs blancs avec une macule *pourprée*, entourée de traits et de coups de pinceaux de même couleur. Première floraison 1837.

Jolie variété.

P. Nebulosum. Buisson moyen. Feuilles lisses, d'un beau vert, comme à 7 lobes. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 15 à 18 lig. de diam. Pétales supérieurs d'un *pourpre fuligineux velouté*, légèrement bordés de *rose*. Pétales inférieurs *roses*, avec une macule et des lignes longitudinales pourprées. Première floraison 1837.

Jolie variété.

CULTURE DE M. JOULAIN, JARDINIER-PÉPINIÉRISTE.

(Au Mail).

Aréthuse (*Noisette*). Buisson vigoureux, à rameaux verts, un peu sarmenteux. 5 à 7 folioles étroites.

Pédoncule hispidule. Ovaire petit, comme cylindrique. Fleur pleine, de 2 po. 8 à 10 lig. de diam., d'un blanc carné, qui se fonce vers le centre. Première floraison 1836.

Jolie variété provenue de la *Rose Maréchal*.

Poire Tavernier. Fruit piriforme, haut de 4 po. sur 2 po. 9 lig. dans son plus grand diam. Queue longue de 18 lig. Œil placé dans une cavité. Peau verte, pointillée de brun-roux. Du roux vers la queue.

Chair ferme, un peu juteuse, peu parfumée.

Cette nouvelle variété, trouvée dans un bois par M. Tavernier de Boulogne qui l'a donnée à M. Joulain, est précieuse par le rapport de sa maturité, qui a lieu vers les premiers jours de juin, et dont quelques individus vont même jusqu'en août.

CULTURE DE M. DÉLÉPINE, JARDINIER.

(Au Mail.)

Poire Auguste. Arbre assez vigoureux, à rameaux d'un rouge violacé et picté de roux-pâle. Feuilles ovales-lancéolées, finement dentées.

Fruit comme sphérique de 20 à 22 lig. de diam., à fond jaune, recouvert en presque totalité par du

roux, teint de rouge du côté du soleil, et marqué de petits points d'un blanc jaunâtre. Œil assez ouvert, peu enfoncé. Queue longue de 5 à 6 lig. Chair blanche, peu juteuse, parfumée. Murit du 5 au 10 août.

Cette nouvelle variété a été obtenue de graine par M. Auguste Délépine.

CULTURE DE M. ROUSSEAU, JARDINIER-FLEURISTE.

(A Angers.)

Acidalie (*Églantier de Bourbon*). Buisson arrondi, vigoureux, à rameaux verts. Aiguillons forts, rougeâtres. 3 à 7 folioles, grandes, ovales-pointues, d'un vert foncé en dessus, glauques en-dessous. Pédoncule hispidule. Ovaire Ovoïde, lisse, bouton jaune pâle. Fleur de 3 po. de diam., assez pleine, faite en coupe, d'un *blanc faiblement carné*, plus pâle sur les pétales extérieurs, qui sont légèrement retournés sur les bords. Mais au bout de quelques jours, lorsque le soleil a fait sentir toute sa force sur cette belle fleur, bientôt une *bandelette rose* se dessine sur le pourtour des pétales. Cette bandelette paraît d'autant plus prononcée que la teinte carnée a presque totalement disparue ; c'est alors une toute

autre fleur; c'est une rose blanche, dont les pétales prennent une bordure rose qui s'agrandit plus ou moins en vieillissant.

En peu de mots, c'est une superbe fleur, dont la teinte rare, dans les roses de cette division, la ferait rechercher des amateurs, quand bien même elle resterait avec sa teinte uniforme.

Janassa (*Perpétuelle*). Buisson arrondi, bien fait, à rameaux verdâtres, couverts de petits aiguillons. 3 à 5 folioles, comme elliptiques. Pédoncule et ovaire velus, ce dernier obconique. Fleur droite de 3 po. de diam., très pleine, mais s'ouvrant bien, *blanc-carné à cœur rose* (ces deux couleurs divisées en deux portions égales). Les pétales, blanc-carné, bien imbriqués et retournés sur les bords, formant une coupe qui renferme les pétales roses; lesquels sont pressés et groupés de la manière la plus heureuse, et dont un certain nombre, sont, au centre, disposés en couronne. Première floraison 1836.

Superbe rose remontante.

Fantase (*Damas*). Buisson arrondi, à rameaux couverts d'aiguillons fins, crochus. 5 à 7 folioles ovales-allongées, fortement dentées et pliées en gouttière. Pédoncule hispidule. Ovaire comme fusiforme, lisse. 3 à 5 fleurs de 3 po. de diam., très pleines, faites comme une *R. Agathe*. Les premières fleurs ordinairement *blanches*, les autres d'un *rose tendre*. Première floraison 1836.

Très belle rose bifère.

Corésie (*Noisette*). Buisson non sarmenteux, arrondi. Aiguillons longs, presque droits, rougeâtres.

5 à 7 folioles moyennes, ondulées sur les bords. Pédoncule hispidule. Ovaire oblong, lisse. Fleur de 2 po. 6 lig. de diam., bien pleine, d'un beau *rose tendre*, nuancé, surtout vers le centre, de rose plus foncé. Pétales extérieurs plus ou moins ponctués ou panachés de rouge. Odeur particulière. Première floraison 1836. Jolie fleur.

Pelargonium Heliconium. Buisson arrondi, bien fait : feuilles lisses, d'un beau vert, à 5 ou 7 lobes. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 20 à 22 lig. de diam. Pétales supérieurs d'un *brun fuligineux pourpré velouté*, variés de raies noirâtres ainsi que de raies pourprées. Pétales inférieurs d'un blanc rosé, couverts en partie par une macule pourprée et de raies de même couleur. Première floraison 1837.

Très belle fleur provenue du *P. Olympicum*.

P. Laxum. Buisson bien arrondi. Feuilles velues, comme à 5 lobes. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 27 à 28 lig. de diam. Pétales supérieurs d'un *rouge vif* : macule en forme de palme, variée de *brun velouté*, de *feu* et de *rose*. Pétales inférieurs d'un *beau rouge* légèrement teint de *lilas*. Première floraison 1837.

Très belle fleur provenue du *P. Davianum*.

P. Decoratum. Buisson bien fait, arrondi. Feuilles d'un beau vert, à 5 lobes principaux (aspect des feuilles du Cassis). Ombelle de 4 à 5 fleurs de 18 lig. de diam., à pétales larges et arrondis, d'un *blanc pur*, avec la macule des pétales supérieurs formant une palme *pourprée-veloutée*. Les pétales inférieurs, sur un fond blanc, sont marqués chacun

d'un petit faisceau composé de *raies pourprées*, traversé par quelques traits de même couleur. Première floraison 1837.

Jolie variété provenue du *P. Versicolor verum*.

P. Opulentum. Buisson bien fait. Feuilles réniformes, lisses, comme à 5 lobes, d'un beau vert. Ombelle de 4 à 5 fleurs droites, de 15 à 20 lig. de diam. Pétales larges et arrondis ; les supérieurs couverts par la macule, qui est d'un *beau noir velouté* et qui se fond en pourpre sur les bords. Cette macule est en outre variée de petites taches pourprées à sa base et de raies noires qui la traversent. Pétales inférieurs d'un *blanc rosé*, traversés par une petite macule pourprée, et légèremnet rayés de pourpre. Première floraison 1836.

Très belle et riche fleur.

P. Inflammatum. Buisson bien fait. Feuilles moyennes, à 3 lobes principaux, lisses, d'un beau vert. Ombelle de 5 à 6 fleur de 20 à 24 lig. de diam. Pétales larges et arrondis ; les supérieurs *rouge-cerise*, avec la macule, en forme de palme, variée de *feu*, de *rose*, de *violet*, et surmontée d'une tache *noire-veloutée*. Pétales inférieurs d'un beau rouge. Première floraison 1837.

Jolie fleur.

P. Floridulum. Buisson bien arrondi. Feuilles lisses, d'un beau vert, comme à 3 lobes principaux crépus et fortement dentés. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 2 po. de diam. ; à pétales larges et arrondis ; les supérieurs d'un beau *rose lavé de ponceau ;* macule en forme de palme, variée de petites taches

ovales *roses*, *violettes* et *feu*, et couronnée d'une tache *noire veloutée*. Pétales inférieurs d'un beau *rose-tendre*, veinés de rose plus foncé, avec leur base *blanc carné*. Première floraison 1837.

Très jolie variété.

P. Pindarium. Buisson bien fait. Feuilles lisses, à 3 ou 5 lobes. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 18 à 20 lig. de diam. Pétales supérieurs d'un beau *pourpre amaranthe*, mais d'un *noir velouté* au centre et bordés d'un liseré *amaranthe pâle*. Pétales inférieurs blancs, marqués d'une large macule amaranthe, variée de petites taches roses. Première floraison 1837.

Jolie variété.

CULTURE DE M. MOIRÉ, JARDINIER.

(Route de Saumur.)

L'Hétéroclite (*Thé*). Buisson assez vigoureux. Fleur pleine, s'ouvrant bien, d'un beau *rose*. Pétales *contournés*, de manière à donner à cette rose un faciès tout particulier et fort remarquable qui doit la faire rechercher pour sa singularité. Première floraison 1836.

Bengale ardent velouté. Buisson assez vigoureux, à rameaux un peu divergents, d'un vert violacé.

Aiguillons violacés. 3 à 5 folioles, rarement 7, petites. Pédoncule long, droit, glanduleux. Fleur de 2 po. 6 à 8 lig. de diam., bien pleine, droite, d'un beau *rouge vif* qui prend du velours en vieillissant. Pétales extérieurs, larges, cordiformes, les intérieurs plus ou moins chiffonnés. Première floraison 1836.

Superbe fleur.

Bengale Anachis. Buisson assez vigoureux. 3 à 5 folioles ovales, moyennes. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire ovoïde, lisse. Fleur droite de 2 po. 6 à 8 lig. de diam., pleine, bien faite ; à pétales non pressés, bien imbriqués, les extérieurs presque orbiculaires, ceux du centre pliés et comme chiffonnés. Première floraison 1836.

Très jolie fleur.

CULTURE DE M. CACHET, JARDINIER FLEURISTE.

(A Angers.)

Pelargonium Diabolicum. Buisson petit, arrondi, bien fait. Feuilles lisses, à 5 lobes principaux. Ombelle droite, de 5 à 6 fleurs de 18 à 20 lig. de diam. Pétales supérieurs larges et arrondis, d'un *noir fuligineux velouté*, légèrement bordés de *rouge*. Pé-

tales inférieurs *rose vif*, avec une large macule *pourpre velouté*, et des nervures rouges sur toutes la surface. Première floraison 1837.

Superbe fleur provenue du *P. Anna Bolena*, et qui se rapproche du *P. Tœnarium* que nous avons décrit dans le précédent numéro.

P. Prædicandum. Buisson bien fait. Feuilles à 5 lobes principaux, d'un vert pâle et presque lisses. Ombelle droite, de 5 à 6 fleurs de 2 po. de diam. Pétales supérieurs couverts par une macule *pourprée*, ombrée de *noir velouté*, et qu'accompagnent quelques nervures, particulièrement du côté extérieur. Pétales inférieurs *blancs*, marqués chacuns d'une légère macule et de 3 nervures pourprées. Première floraison 1837.

Variété des plus jolies, provenue du *P. Dilectum*.

P. Refulgidum. Buisson bien fait. Feuilles presque lisses, à 5 lobes. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 2 po. 6 lig. de diam. Pétales larges et arrondis, d'un beau *rouge-carminé*, avec la macule variée de *rose*, de *feu* et de *brun-velouté*. Pétales inférieurs larges, d'un beau *rouge légèrement lilacé*. Première floraison 1837.

Très grande et très belle fleur.

CULTURE DE M. MAILLARD, JARDINIER-FLEURISTE.

(A Angers.)

Pelargonium Hilare. Buisson petit, bien fait. Feuillage moyen, presque lisse. Ombelle de 4 à 5 fleurs droites, de 15 à 18 lig. de diam., d'un *blanc éclatant* avec la macule ovale-pointue, pourprée, et variée de lignes brunes et de petites taches d'un blanc rosé. Première floraison 1836.

Jolie variété.

CULTURE DE M. AUBERT, JARDINIER.

(Faubourg S.t-Samson.)

Perpétuelle Aubert. Buisson arrondi. 5 à 7 folioles elliptiques. Pédoncule hispidule. Ovaire obconique, en partie hispidule. Fleur droite, de 2 po. 6 à 8 lig. de diam., bien pleine, un peu aplatie en dessus, d'un rose nuancé de rose plus foncé. Première floraison 1836.

Jolie variété.

FLORAISON DU CACTUS MONSTRUOSUS.

Nous terminerons ce travail, pour l'année 1837, par la description de la fleur du *Cactus Monstruosus*, qui s'est montrée dans notre jardin, le 10 août 1837, pour la première fois.

Bien qu'on ne puisse regarder l'épanouissement de cette fleur comme une chose analogue, et qu'on dût classer avec les fleurs qui ont pris naissance dans notre département ; cependant l'épanouissement de ce Cactus présentait un fait tellement rare que la plupart des horticulteurs sont persuadés que cette plante ne fleurit pas. Ce motif seul eût été suffisant pour nous décider à en faire la description ; si cet autre, non moins puissant, qui tend à prouver que ce Cactus n'est qu'une variété du *C. Peruvianus*, n'était venu en quelque sorte nous fortifier dans cette idée.

Voici la description de la Fleur du CACTUS MONSTRUOSUS (J. des P. de Paris). Cactus Abnormis (*Willd*).

Ovaire sessile, cannelé, d'un beau vert, lisse, surmonté d'une fleur de 5 po. 6 lig. de longueur et de 3 po. de largeur. Tube de la fleur d'un beau

vert, cannelé, au moyen de la décurrence des écailles calicinales, qui sont charnues, imbriquées et comme spatulées : les plus extérieures sont vertes et terminées de brun-roux ; la teinte des suivantes diminue d'autant plus d'intensité que celles-ci se rapprochent davantage des pétales qui sont oblongs, frangés à leur sommet, blanchâtres, et légèrement lavés de rose à leur extrémité. Les étamines, d'inégale longueur et disposées en entonnoir, ont les filets blancs, les anthères légèrement jaunâtres. Elles entourent le pistil, qui est très long et surmonté d'un stigmate formé de 10 à 12 lanières charnues, étroites. Odeur presque nulle.

Comme on le voit, cette fleur, qui épanouit le soir à 8 heures et se fanne le lendemain matin presque à la même heure, a tellement de rapport avec celle du *Cactus Peruvianus* lin, qu'on ne peut se dispenser de la regarder comme une variété de ce dernier.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TROISIÈME VOLUME.

CULTURES DE MM. :

	Pages.
Aubert	218.
Audio	44, 146, 206.
Audusson	105.
Augeul	66, 149, 199.
Barbot	195.
De Beauregard	48, 146.
Bellanger	200.
Benoist	107.
Besnier	79, 152, 186, 203.
Bidault	74, 168.
Bizard	5, 123, 173, 191.
Bocage	95.
Bougère	78, 179.
Broux	200.
Breton	201.
Buret	65, 181.
Cachet	83, 161, 185, 216.
Chesneau	202.
Coquereau	42, 144.
Delaage	15, 130.
Delepine	210.
Derouineau	188.
Flon	56, 147, 176, 195.

Pages.

Gaignard . . . . . 166.
Garnier. . . . . 71.
De Gennes. . . . . 97.
Gendron. . . . . 49.
Gentilhomme . . . . . 68.
Goubault . . . . . 67, 151, 178, 197.
Guérin . . . . . 28, 139, 175, 193.
Guichet. . . . . 105.
Guinoiseau. . . . . 72.
Hamon . . . . . 50.
Joulain. . . . . 209.
Lebreton, aîné. . . . . 98.
Lebreton, jeune . . . . . 100, 167.
Lepage. . . . . 201.
Leroy, du Grand-Jardin. . . . 102, 151, 177.
Leroy, jeune. . . . . 101.
Letemplier. . . . . 187, 207.
Maillard. . . . . 90, 218.
Mansais. . . . . 177, 198.
Marchesseau . . . . . 165.
Maréchal . . . . . 53.
Marin . . . . . 47.
Moiré . . . . . 215.
Morier-Desportes. . . . . 71.
Morisseau. . . . . 106.
Mousseau . . . . . 48.
De Nerbonne. . . . . 77.
Potard. . . . . 63.
Rousseau . . . . . 91, 155, 181, 211.
Vau. . . . . 180, 203.
Verdier. . . . . 108.

TABLE DES MATIÈRES.

Cultures de 1836.

AVERTISSEMENT..... *Page* 169
Culture de M. Bizard..... 173
— de M. Guérin..... 175
— de M. Flon..... 176
— de M. Mansais..... 177
— de M. Leroy, du Grand-Jardin..... 177
— de M. Goubault..... 178
— de M. Bougère..... 179
— de M. Vau..... 180
— de M. Buret..... 181
— de M. Rousseau..... 181
— de M. Cachet..... 185
— de M. Besnier..... 186
— de M. Letemplier..... 187
— de M. Derouineau..... 188

Cultures de 1837.

Culture de M. Bizard..... 191
— de M. Guérin..... 193
— de M. Barbot..... 195
— de M. Flon..... 195
— de M. Goubault..... 197
— de M. Mansais..... 198
— de M. Augeul..... 199
— de M. Braux..... 200
— de M. Bellanger..... 200
— de M. Lebreton..... 201
— de M. Lepage..... 201
— de M. Chesneau..... 202
— de M. Vau..... 203
— de M. Besnier..... 203
— de M. Audio..... 206

TABLE.

Culture de M. Letemplier..... *Page* 207
— de M. Joulain..... 209
— de M. Délépine..... 210
— de M. Rousseau..... 211
— de M. Moiré..... 215
— de M. Cachet..... 216
— de M. Maillard..... 218
— de M. Aubert..... 218
Floraison du Cactus Monstruosus..... 219